

FeedStart

Aanvullend diervoeder voor kalveren



ANALYSE

Ruw eiwit	18,00%	Lysine	1,70%	Calcium	0,80%
Ruw vet	15,00%	Ruwe as	7,50%	Natrium	0,50%
Ruwe celstof	0,10%	Fosfor	0,70%		

SAMENSTELLING

Zoete weipoeder; volle melkpoeder, rijk aan immunoglobulines; plantaardig vet (palm/kokos), geraffineerd; eipoeder, rijk aan immunoglobulines; tarwezetmeel.

TOEVOEGINGSMIDDELEN*

Nutritionele additieven

Vitamine A (E672a)	16.000 I.E.	Mangaan (Mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat, E5)	28 mg
Vitamine D ₃ (E671)	5.000 I.E.	Zink (als zinkchloridehydroxide-monohydraat, 3b609)	37 mg
Vitamine E (3a700)	225 mg	Jodium (Calciumjodaat, watervrij, 3b202)	0,5 mg
IJzer (glycine-ijzerchelaat, hydraat, E1)	100 mg	Selenium (natriumseleniet, E8) en seleniummethionine (uit sacch. cer. NCYC R397, 3b8.11)	0,3 mg
Koper (Dikoperchloridetrihydroxide, 3b409)	9 mg	Betacaroteen (3a160(a))	250 mg

*) nutritionele additieven per kg voermiddelen

Darmflorastabilisatoren: 1 x 10⁹ KVE Enterococcus faecium NCIMB 11181 (4b1708) (melkzuurbacteriën)

1,3 x 10⁹ KVE Bacillus licheniformis DSM 5749 – Bacillus subtilis DSM 5750 (4b1700i)

Technologische toevoegingsmiddelen: Citroenzuur (E330)

GEBRUIK

Ter vervanging van colostrum: Voer FeedStart zo snel mogelijk na de geboorte (tijdens de eerste uren).

Ter aanvulling van colostrum: Bij aangekochte koeien, vaarzen, zieke moederdieren, slechte biestkwaliteit of gebrek aan hoeveelheid.

TOEPASSING & DOSERING

Ter vervanging of aanvulling van colostrum

- Bij gebrek aan hoeveelheid of kwaliteit colostrum van het moederdier of bij overlijden of uierontsteking
- Bevat melkzuurbacteriën ter stabilisering van de darmflora
- Met immunoglobulines uit colostrum van IBR-vrije koeien en speciale eipoeder, rijk aan antistoffen
- Met betacaroteen en vitaminen ter ondersteuning van het immuun-systeem in de eerste levensweken

Ter vervanging van colostrum:

Los 400 g FeedStart op in 2 l warm water (40°C). Herhaal procedure na ca. 6-8 uur als tweede maaltijd.

Ter aanvulling van colostrum:

Los 400 g FeedStart op in 2 l warm water (40°C) en voer ca. 6-8 uur na de geboorte als tweede maaltijd.

WACHTTIJDEN

Geen.

BEWAREN

Bij kamertemperatuur (15°-20°C) in goed gesloten verpakking bewaren.

INHOUD

Pot à 800 gram.

FeedStart wordt geproduceerd op GMP locatienummer 18973. Registratienummer fabrikant DE NW 113866.